

## PRISE EN CHARGE

### 1 - PROPOSER

« Je souhaiterais que l'on fasse le point ensemble sur vos besoins en médicament et un test sérologique Covid 19. Qu'en pensez-vous ? »

### 2 - INFORMER

« Le test sérologique permet de savoir si vous avez été au contact avec le virus et si nécessaire de vous donner les moyens d'en prévenir vos proches.»

### 3 - EXPLORER

- Les signes d'alerte
- La fréquence des renouvellements et le risque d'une perte de la continuité des soins
- La vérification de la bonne utilisation des médicaments prescrits et si nécessaire l'établissement d'un plan de prise et d'un calendrier de renouvellement.

### EN CAS DE SÉROLOGIE

- **Si négative** : « Le test est négatif. Vous devez continuer à pratiquer les gestes barrières.»
- **Si positive** : « Vous avez été au contact du virus il y a plus de 3 semaines. **Il est nécessaire que vous en informiez votre médecin traitant, vos proches et les personnes avec qui vous avez été en contact rapproché. Vous devez continuer à pratiquer les gestes barrières.** »
- **Donner compte-rendu patient à destination du médecin traitant et proposer une liste vierge pour répertorier les personnes-contacts.**

**Affirmer que les documents remis ne sont en aucun cas des certificats**

## Entretien ou complément d'un bilan partagé de médication pour les personnes polymédiquées en post- confinement

L'objet de cet entretien est de s'assurer que la continuité des soins a été effective et que l'état de santé de la personne ne s'est pas détérioré.


La pratique d'un TROD covid 19 peut s'intégrer à cette démarche pour établir si la personne a été au contact du Covid 19.

## CONSEILS



### S'assurer

- des capacités du patient à se déplacer sans risque ;
- de l'absence de signes évoquant la maladie ;
- de la validité des tests (HAS et marquage CE) ;
- d'un minimum de 20 jours après la survenue de signes potentiellement évocateurs d'une infection par covid 19.



### À prendre en compte

- L'importance de la présence de l'aidant si nécessaire.
- Les fragilités psychologiques ou physiques post-confinement.
- Les attentes et la compréhension des différents tests.



### Outils

- Affiche et brochure informant de la possibilité d'un entretien post-confinement.
- Autoquestionnaire, lettre information médecin, liste vierge personnes-contacts.
- Masque, gel hydro-alcoolique, gant à usage unique.
- Kit sérologique validé par la HAS



### Organisation

- Uniquement sur rendez-vous.
- Durée de l'entretien : moins de 15 minutes.
- Respect de la distanciation dans un espace de confidentialité aérée et port du masque.
- Mise en place d'un auto-questionnaire afin de limiter la durée de l'entretien.

RESPECTER ET RAPPELER LES GESTES BARRIÈRES

## POUR AGIR

### Les objectifs de l'entretien

- Détecter des signes d'alerte
- Définir le statut sérologique Covid 19
- Favoriser l'information des personnes contacts et du médecin traitant en cas de sérologie positive
- Orienter si nécessaire vers le médecin traitant

### Signes d'alerte

CE QUI EST OBSERVABLE	CE QUI PEUT ÊTRE OBJECTIVÉ	ORIENTATION en cas de changement ou de survenue
Les signes du Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toux, fièvre, perte de l'odorat et du goût, diarrhée, écoulement nasal...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire</li> </ul>
Difficultés à se déplacer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque d'assurance dans la démarche</li> <li>• Vitesse de déplacement</li> <li>• Demande à s'asseoir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire si perte d'autonomie</li> </ul>
Essoufflement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité à faire des phrases</li> <li>• Utilisation d'un oxymètre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si valeur inférieure à 95 %</li> </ul>
Comportement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutisme</li> <li>• Ne se préoccupe plus de son apparence et néglige son hygiène corporelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire</li> </ul>
Déséquilibre des constantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glycémie</li> <li>• Pression artérielle</li> <li>• Cholestérolémie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire si chiffres anormaux</li> </ul>
Asthénie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte de motivation</li> <li>• Perte de la vie de relation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire si persistante</li> </ul>
Chute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecchymoses visibles</li> <li>• Manque d'assurance dans la démarche</li> <li>• Douleurs à la mobilisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nécessaire si douleurs non prises en charge</li> <li>• Obligatoire si chutes fréquentes et/ou si la personne n'a pas pu se relever.</li> </ul>