

PRISE EN CHARGE

1 - PROPOSER

« Je peux pratiquer un test sérologique Covid 19 pour connaître votre statut sérologique. Qu'en pensez-vous ? »

2 - EXPLIQUER

« Le test sérologique permet de savoir si vous avez été au contact avec le virus et si nécessaire d'en prévenir vos proches.»

3 - EXPLORER

- Les signes d'alerte évoquant une infection par SARS CoV2, voire la maladie elle-même.
- Les attentes et la compréhension de l'utilité des différents tests.
- La mise en pratique des gestes barrières.

EN CAS DE SÉROLOGIE

- **Si négative** : « Le test est négatif. Vous devez continuer à pratiquer les gestes barrières.»
- **Si positive** : « Vous avez été au contact du virus il y a plus de 3 semaines. **Il est nécessaire que vous en informiez votre médecin traitant, vos proches et les personnes avec qui vous avez été en contact rapproché. Vous devez continuer à pratiquer les gestes barrières.** »
- **Donner compte-rendu patient à destination du médecin traitant et proposer une liste vierge pour répertorier les personnes-contacts.**

Affirmer que les documents remis ne sont en aucun cas des certificats

Pratique d'un TROD Covid 19


L'objet de ce test est de définir le statut sérologique de la personne, et de l'orienter vers des démarches potentiellement utiles.

CONSEILS



S'assurer

- de l'absence de signes évoquant la maladie et si nécessaire d'orienter le patient vers son médecin traitant ou les services adéquats.
- de la validité des tests (HAS et marquage CE).
- d'un minimum de 20 jours après la survenue de signes potentiellement évocateurs d'une infection par covid 19.



À prendre en compte

- Les attentes et la compréhension de l'utilité des différents tests.



Outils

- Affiche et brochure informant de la pratique d'un test sérologique Covid 19
- Autoquestionnaire, Compteur patient-médecin, liste vierge personnes contact
- Masque, gel hydro-alcoolique, gant à usage unique
- Kit sérologique validé par la HAS



Organisation

- Uniquement sur rendez-vous.
- Respect de la distanciation dans un espace de confidentialité aérée et port du masque.
- Mise en place d'un auto-questionnaire afin de limiter la durée de l'entretien.

RESPECTER ET RAPPELER LES GESTES BARRIÈRES

POUR AGIR

Les objectifs de l'entretien

- Détecter des signes d'alerte
- Définir le statut sérologique Covid 19.
- Favoriser l'information des personnes-contacts et du médecin traitant en cas de sérologie positive.
- Orienter si nécessaire vers le médecin traitant.

Signes d'alerte

CE QUI EST OBSERVABLE	CE QUI PEUT ÊTRE OBJECTIVÉ	ORIENTATION en cas de changement ou de survenue
Essoufflement ou toux	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité à faire des phrases • Utilisation d'un oxymètre 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatoire si valeur inférieure à 95 %
Diarrhée		<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire en l'absence d'autres explications
Odorat et/ou du goût		<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire en cas de perte sans autres explications
Asthénie	<ul style="list-style-type: none"> • Mutisme • Ne se préoccupe plus de son apparence et néglige son hygiène corporelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire si persistant et associé à des troubles du sommeil ou anxieux
Fièvre	<ul style="list-style-type: none"> • Plus de 38° (en fonction de l'étalonnage de l'instrument de mesure) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire si absence d'autres explications
Installation des symptômes		<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire si survenue en un à deux jours (vs apparition brutale dans le cas d'une grippe)